



Avertissements agricoles

BRETAGNE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35700 RENNES ☎ 99 36 01 74

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES



Publication périodique

ÉDITION : GRANDES CULTURES

BULLETIN N°93
(Supplément au n°179)

7 novembre 1989

CEREALES *J.N.O.: risque faible maintenant pour les semis récents ou en cours*

COLZA *→ faible présence en moyenne des grosses altises
→ nouveaux produits antigaminées en postlevée*

CEREALES D'HIVER

Jaunisse nanisante

SITUATION

Forte diminution des vols de *Ropalosiphum padi* (principale espèce de puceron transmettant le virus), ainsi que de l'infestation des pots pièges. Le "pouvoir virulifère" reste toujours élevé. L'infestation des cultures semées après la mi-octobre est très en dessous des seuils de risque.

PRECONISATIONS

→ Pour les semis très précoces de début Octobre, qui sont actuellement entre deux et trois feuilles, faire un traitement insecticide d'urgence, si ce n'est déjà fait (voir nos précédents bulletins). Ceci ne concerne, à notre connaissance, qu'une minorité de cultures. Cette préconisation s'applique aux parcelles d'orge, bien sûr, mais aussi de blé, avoine et triticale. Si un traitement a déjà été réalisé, il est inutile de le renouveler.

→ Pour les cultures semées après le 25 octobre, la décision est à prendre d'ici 10 à 15 jours. D'après nos prévisions, aucun traitement ne sera nécessaire à ce stade. Nous rappelons cependant, qu'en cas d'automne très doux, il peut être nécessaire d'intervenir beaucoup plus tard, en début d'hiver.

Ces conseils sont valables jusqu'à notre prochain bulletin (vers le 17 novembre).

P.20
.../...

COLZA

Grosses altises

Les captures en cuvette jaune sont faibles et peu de morsures sont observées. Les cultures vont dépasser le stade de sensibilité aux adultes (stade 3 feuilles vraies étalées). Aucune intervention n'est donc nécessaire. Par contre, une visite des parcelles est toujours indispensable en décembre pour détecter la présence éventuelle de larves.

Désherbage antigraminée en postlevée

Ces interventions précoces avec des produits spécifiques à action foliaire sont particulièrement conseillées en cas d'infestations importantes par des graminées dès la levée (repousses de céréales notamment) ou en début d'automne. Pour des infestations plus tardives ou en cas de levées échelonnées, il est souvent préférable d'utiliser des produits à action racinaire (voir nos prochains bulletins).

Outre les spécialités déjà connues FUSILADE X2, FERVIN, FERVINAL, GALLANT, TARGA, trois nouveaux produits viennent compléter la gamme. Il s'agit de AGIL (La Quinoléine); STRATOS (B.A.S.F.); TARGA D+ (Pepro). Vous trouverez ci-contre leurs principales caractéristiques ainsi que les résultats des essais 88-89.